


# CEBOLLA Y CARNE, UNA BUENA COMBINACION

**MV. RIOS, Luis**  
Mayor Buratovich  
[luisriosvet@gmail.com](mailto:luisriosvet@gmail.com)



21 de Septiembre de 2011






## Datos Socioeconómicos

ESTRATOS	% de LA SUP TOTAL	% de PRODUCTORES
hasta 39	1,44	30,1
40-119	5,4	29,1
120-499	16,8	25,7
+ de 500	76,4	15,1

Adaptado de [www.corforiocolorado.gov.ar](http://www.corforiocolorado.gov.ar); 2011.

## Datos Socioeconómicos



Fuente: UNS-CORFO Rio Colorado(2009/2010)

## PROBLEMATICA

- Incremento de enfermedades en la cebolla.



CORFO Rio Colorado, FunBaPa, INTA Ascasubi y UNS. 2010

**Integración rionegrina**

Inicio Comarca Personales Economía Municipales Deportes Bazarros Publica

**RIO COLORADO**  
**RESTRICCIONES PARA EL AGUA Y MAYOR SALINIDAD**

24/07/11 | La Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO Río Colorado) informa que debido a la escasez de nieve en la alta cuenca del río Colorado en el invierno pasado, el caudal del río Colorado ha sido muy bajo, siendo aproximadamente la mitad de un año normal. Esto trajo como consecuencia la utilización de las reservas del Embalse Casa de Piedra para cubrir los requerimientos de la cuenca, fundamentalmente para el riego en nuestra zona.

Estas reservas han llevado a su nivel histórico más bajo, por lo que, en la campaña de riego que comienza, se aplicarán restricciones para poder garantizar el riego durante la presente temporada y el comienzo de la próxima (2012-13), siendo posible que se deba bajar a una dotación de 0,4 litros por segundo por hectárea. Estas medidas se mantendrán hasta que se logren recuperar reservas suficientes para asegurar toda la demanda de la cuenca y tener nuevamente una reserva para años venideros.

Junio 28 de julio de 2011

Edición impresa **Integración**

**RIO COLORADO**  
**A cuidar mucho el agua**

Arrancó con instantes la etapa productiva en los valles ubicados junto al cauce. Si bien el invierno aún no terminó, la nieve acumulada en las altas cuencas es aún menor a igual fecha del año pasado, período que fue considerado extra seco. Recomendaciones a los productores.

Escuchanos en Vivo  
 AM 630 RIVADAVIA  
 Encuestas Sondeos  
 LA NUEVA PROVINCIA .com

## RIEGO

- Características del campo.
- Canon de Riego.
- Necesidades hídricas de los cultivos.

# RIEGO






## OBJETIVOS

Evaluar el efecto de la incorporación de una pastura sobre la producción de carne y rentabilidad de la empresa


## Situación actual



## Análisis Económico

ACTIVIDAD	MB/ha	Ha	MB
TRIGO	1197	30	35910
CEBOLLA	4500	30	135000
ALFALFA SEMILLA	3549	50	177450
ROLLOS	-	-	35350
CRIA	997	420*	418765

\*ha Ganadera efectiva




### MB/ha.CULTIVO - MB/ha.CANON

	MB/HA	MB/HA CANON	HA CANON
CEBOLLA	4500	900	150
TRIGO	1197	1197	30
ALFALFA	4811,4*	5977*	73


\* Produccion de semilla, carne, henos comercializados.

## Planteo alternativo



## Análisis Económico

ACTIVIDAD	MB/ha	Ha	MB
TRIGO	1197	30	35910
CEBOLLA	4500	15	67500
ALFALFA SEMILLA	3549	50	177450
ROLLOS	-	-	26110
CRÍA	1582	435	688509



### COMPARATIVO

PLANTEO ACTUAL		PLANTEO ALTERNATIVO		DIFERENCIAL
MB CEBOLLA	135000	MB CEBOLLA	67500	-67500
MB ROLLO	35350	MB ROLLO	26110	-9240
MB CRIA	418765	MB CRIA	688509	269743
MB GLOBAL	802475	MB GLOBAL	995479	193003
RESULTADO POR PRODUCCION	565450	RESULTADO POR PRODUCCION	720421	231635
RENTABILIDAD (%)	8,2	RENTABILIDAD (%)	9,7	1,5

## EFICIENCIA DEL USO DE RIEGO

	\$ TOTALES	HA CANON	\$/HA de CANON
RPP ACTUAL	565450	253	2235
RPP ALTERNATIVO	720422	253	2848
DIFERENCIA ENTRE ALTERNATIVAS (\$/HA CANON)			613

## Conclusiones

- La incorporación de pasturas permite aumentar la producción de carne en 89kg/ha ganadera efectiva.
- Este aumento en la producción de carne, tiene un impacto positivo sobre el Margen Bruto de la actividad cría, el cual aumenta 585\$/ha ganadera efectiva.

## Conclusiones

- La Rentabilidad del planteo alternativo aumenta en un 1,5%, con respecto a la situación actual.

## Conclusiones

- Si bien el cultivo de cebolla ofrece un importante ingreso por unidad de superficie, cuando consideramos las hectáreas de canon de riego utilizadas para cubrir las necesidades hídricas, observamos una notable disminución en relación con las demás actividades.
- La producción forrajera alcanzada, permitiría analizar la posibilidad de realizar la invernada de los terneros del planteo actual, en lugar de aumentar la actividad cría.

## ZONA SECANA

- PRODUCCIÓN DE CARNE: 40-60 kg/ha.
- SUELOS SUCEPTIBLES A LA EROSIÓN.
- BAJO NIVEL TECNOLÓGICO.





MUCHAS GRACIAS